


Compte rendu

16241067 Emma Bai Li
16241070 Céline Lei Yangqi


1.a) D'après la figure, on peut trouver que la performance de discriminateur PI est mieux que le discriminateur de Hebb, parce que PI est plus proche et semblable du w vrai que le Hebb.



1.b) Si on change Papp=2000, les performances des deux discriminateurs sont améliorées, et le discriminateur PI est un peu mieux aussi.

1.c) Dans la base non-linéairement séparable, les performances des PI et Hebb sont semblables, on ne peut pas séparer dans cette base(non-linéaire).

2.a)



C'est une ligne droite.

2.b) $\log(\widehat{\sigma}_{\tau_g})$ a une relation linéaire avec $\log(P_{gen})$.

$$\log(\widehat{\sigma}_{\tau_g}) = -0.0478 \log(P_{gen}) + 0.17$$

2.c) Quand $P_{gen}=10, 100, 1000$, la relation est bien vérifiée, quand $P_{gen}=10000$, la relation a un peu de déviation.

2.d)
$$\sigma_{\tau_g} = \sqrt{\frac{\tau_g(1-\tau_g)}{P_{gen}}}$$

Question : Pourquoi on peut utiliser τ_g pour remplacer μ_{τ_g} comme une relation d'estimateur de l'écart type.

3.a) Pour τ_{app} PI est mieux que Hebb, mais quand P_{app} augmente, la performance de PI diminue. Pour τ_g , quand P_{app} augmente, la performance améliore mais a une réduction $P_{app} = 42$ d'après la figure.

Question : pourquoi la performance de PI diminue quand P_{app} augmente ?


Pourquoi il y a une réduction évidente ?

3.b) Quand $P_{gen}=100,1000,10000,100000\dots$, les points sont plus serrés, et ils sont placés dans une certaine largeur.

Question : Je ne comprend comment on trouve s'il y a de bruit dans la figure?

Comment on peut connaître le bruit est plus ou moins?

4.a)



Quand σ est petit, la performance de RA est comme PI, mais quand σ est grand, la performance de RA est comme Hebb.

Pour τ_{app} , si σ est petit, RA fonctionne comme PI, si σ est grand, RA fonctionne comme Hebb.

4.b) Pour la base d'apprentissage, quand σ est petit, la performance de RA est comme PI, quand σ est grand, la performance de RA est comme Hebb.

Pour la base de généralisation, RA fonctionne comme Hebb, pour tous les σ .

4.c) Oui, on peut voir sur la figure, le taux de réussite varié beaucoup avec la valeur de σ .

